

## المحور : الدوال الأسية واللوغاريتمية

### الجزء الثاني : الدوال اللوغاريتمية

**التمرين (01)** عيّن مجموعة تعريف الدالة  $f$  في كل حالة من الحالات التالية :

$$f(x) = \ln(x+2)^2 \quad (2)$$

$$f(x) = \ln(x^2 + 2x - 3) \quad (1)$$

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \quad (4)$$

$$f(x) = \ln|x+1| \quad (3)$$

$$f(x) = \ln(x+2) - \ln(x-1) \quad (6)$$

$$f(x) = \ln\left|\frac{x+2}{x-1}\right| \quad (5)$$

$$f(x) = \ln(-2x+3) \quad (8)$$

$$f(x) = \ln|x+1| - \ln|x| \quad (7)$$

**التمرين (02)** عيّن مجموعة تعريف الدالة  $f$  في كل حالة من الحالات التالية :

$$f(x) = \ln(\ln(x)) \quad (2)$$

$$f(x) = \frac{x}{\ln x - 1} \quad (1)$$

$$f(x) = \sqrt{\ln(x)} \quad (4)$$

$$f(x) = \frac{\ln(x+2)}{\ln(x)-2} \quad (3)$$

$$f(x) = \sqrt{1+\ln(x)} \quad (6)$$

$$f(x) = \sqrt{1-(\ln x)^2} \quad (5)$$

**التمرين (03)** حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية :

$$\ln(3-x) - \ln\sqrt{x+1} = \frac{1}{2}\ln(2x) \quad (1)$$

$$\ln(4x-10) + \ln(2x-2)^2 - 2\ln(4x-4) = 0 \quad (2)$$

$$2(\ln x)^3 - 7(\ln x)^2 + 3(\ln x) = 0 \quad (3)$$

**التمرين (04)** حل في  $\mathbb{R}$  المتراجحات التالية :

$$\ln(2x+3) < 4 \quad (3) \quad , \quad \ln 2x > -1 \quad (2) \quad , \quad \ln x < 1 \quad (1)$$

$$2\ln(x-1) + 3 \geq 0 \quad (6) \quad , \quad \ln\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) \leq 0 \quad (5) \quad , \quad \ln(x-2)^2 \geq 0 \quad (4)$$

التمرين (05) بسط ما يلي :

$$C = \ln 2 + \ln(8e) - \ln(4e^2) \bullet \quad B = \ln(e\sqrt{e}) \bullet \quad A = \ln e^3 - \ln e^2 \bullet$$

$$D = \ln\left(\frac{1}{e}\right)^2 - \ln^2\left(\frac{1}{e}\right) \bullet$$

التمرين (06) ادرس إشارة العبارات الجبرية التالية :

$$\begin{aligned} & (1) \quad 2\ln x - 1 \quad , \quad (2) \quad \ln^2 x - \ln x - 6 < 0 \quad , \quad (3) \quad (\ln x - 1)\ln x \\ & (4) \quad \frac{2 - \ln x}{1 + \ln x} \quad , \quad (5) \quad 3 + 2\ln x \quad , \quad (6) \quad 2x \ln(1 - x) \end{aligned}$$

التمرين (07) حل في  $\mathbb{R}^2$  الجمل التالية :

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln \sqrt{3} - 2\ln 2 \\ 2(x + y) = \sqrt{3} + 1 \end{cases} \quad (2) \quad , \quad \begin{cases} x^2 + 2y = 16 \\ \ln\left(\frac{x}{y}\right) = -\ln 3 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x + y = 19 \\ \ln x + \ln y = 2\ln 2 + \ln 15 \end{cases} \quad (4) \quad , \quad \begin{cases} x \cdot y = 4 \\ (\ln x)^2 + (\ln y)^2 = \frac{5}{2}(\ln 2)^2 \end{cases} \quad (3)$$

التمرين (08) احسب النهايات التالية :

$$\begin{aligned} & (1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \quad , \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x + 1)}{x} \quad , \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 2)}{\ln x} \\ & (4) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} + 5\ln x \quad , \quad (5) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cdot \ln x \quad , \quad (6) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} \\ & (7) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{x} \quad , \quad (8) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [x + 2 - \ln(x + 1)^2] \quad , \quad (9) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

التمرين (09) احسب النهايات التالية :

$$\begin{aligned} & (1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 2\ln x}{x + \ln x} \quad , \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2}{x \ln x} \quad , \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x - x^2)}{x} \\ & (4) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + 3x)}{\sqrt{x}} \quad , \quad (5) \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x + 1} + \ln(x + 1) \quad , \quad (6) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

التمرين (10)  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

- أثبت أن الدالة  $f$  فردية .

**التمرين (11)**  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ:  $f(x) = \frac{x + \ln x}{x}$

ولیکن  $C_f$  منحنیها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$

(2) اكتب معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى  $C_f$

(3) بيّن أن المعادلة:  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $x_0$  في المجال  $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

(4) ارسم المنحنى  $C_f$ .

**التمرين (12)**  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ:

$$f(x) = (\ln x)^2 - \ln x - 2$$

ولیکن  $C_f$  منحنیها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$

(2) عيّن إحداثيات نقط تقاطع المنحنى  $C_f$  مع المحورين الإحداثيين.

(3) ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى  $C_f$

(4) ارسم المنحنى  $C_f$ .

**التمرين (13)**  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ:  $f(x) = \frac{1 + \ln(x^2)}{x}$

ولیکن  $C_f$  منحنیها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس شفعية الدالة  $f$

(2) ادرس تغيرات الدالة  $f$  في المجال  $]0; +\infty[$

(3) اكتب معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى  $C_f$ .

(4) عيّن إحداثيات نقط تقاطع المنحنى  $C_f$  مع محاور الإحداثيات ثم ارسم المنحنى  $C_f$

**التمرين (14)**  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ

$$f(x) = x + 2 + \ln \left| \frac{x}{x+2} \right|$$

ولیکن  $C_f$  منحنیها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$

(2) اثبت أن المنحنى الممثل  $C_f$  لها يقبل مستقيما مقاربا  $(\Delta)$  مائلا يطلب إعطاء معادلته.

(3) عيّن النقطة  $\omega$  تقاطع المنحنى  $C_f$  مع المستقيم  $(\Delta)$  و أثبت أنها مركز تناظر للمنحنى  $C_f$ .

(4) احسب:  $f(-3)$  و  $f\left(-\frac{5}{2}\right)$  و  $f(-4)$  ثم ارسم المنحنى  $C_f$ .

**التمرين (15)** الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $f$  المعرفة بـ :

$$f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln(x+1)$$

وليكن  $C_f$  منحنىها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$  و ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى  $C_f$

(2) بيّن أن المنحنى  $C_f$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

(3) ارسم المنحنى  $C_f$

**التمرين (16)** /1 لتكن الدالة العددية  $g$  المعرفة كما يلي :  $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$

(أ) ادرس تغيرات الدالة  $g$

(ب) احسب  $g(1)$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$  تبعا لقيم  $x$  في المجال  $]0; +\infty[$

/2 لتكن الدالة العددية  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة كما يلي :  $f(x) = 3 - x + \frac{\ln x}{x}$

وليكن  $C_f$  منحنىها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(أ) ادرس تغيرات الدالة  $f$

(ب) أثبت أن المنحنى  $C_f$  يقبل مستقيما مقاربا مائلا  $(\Delta)$  يطلب تعيين معادلته

(ج) ادرس وضعية المنحنى  $C_f$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$ .

(د) بيّن أن المنحنى  $C_f$  يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما  $x_0$  و  $x_1$  حيث :

$$\frac{1}{4} < x_0 < 1 \quad \text{و} \quad 3 < x_1 < 4 \quad \text{ثم ارسم المنحنى } C_f$$

**التمرين (17)** لتكن الدالة العددية  $g$  المعرفة كما يلي :  $f(x) = 1 + (\ln x)^2$

وليكن  $C_f$  منحنىها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$  و حدّد طبيعة الفروع اللانهائية .

(2) أثبت أن المنحنى  $C_f$  يقبل نقطة انعطاف يطلب  $\omega$  يطلب تعيينها.

(3) اكتب معادلة المماس  $(\Delta)$  للمنحنى  $C_f$  في النقطة ذات الفاصلة  $x_0 = e$

(4) ارسم  $(\Delta)$  و  $C_f$ .

**التمرين (18)** الدالة العددية :  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \ln|x+1|$

وليكن  $C_f$  منحنىها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحنى  $C_f$

(2) برهن أنه توجد نقطتا انعطاف للمنحنى  $C_f$  يطلب تعيين إحداثيي كل منهما.

(3) جد معادلة كل من المماسين للمنحنى  $C_f$  عند نقطتي الانعطاف

(4) أنشئ هذين المماسين ثم أنشئ المنحنى  $C_f$ .

**التمرين (19)** نعتبر الدالة العددية  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  و المعرفة كما يلي :

$$f(x) = x - 2 + \ln(x - 1)$$

وليكن  $C_f$  منحنيتها البياني في المستوي المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (الوحدة :  $\frac{1}{2}cm$ )

- 1/ ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحني  $C_f$
- 2/ احسب  $f(2)$  واستنتج إشارة  $f(x)$
- 3/ جد معادلة للمماس  $(\Delta)$  للمنحني  $C_f$  عند النقطة ذات الفاصلة 2
- 4/ احسب احداثي  $A$  نقطة تقاطع  $C_f$  مع المستقيم  $(D)$  الذي معادلته :  $y = x$ .
- 5/ أنشئ  $(\Delta)$  و  $C_f$ .
- 6/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة :  $f(x) = 2x + m$

**التمرين (20) -1** لتكن  $\varphi$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بـ:

$$\varphi(x) = x^2 - 4x + 3 + 6\ln|x - 2|$$

أ- احسب  $\varphi(1)$  و  $\varphi(3)$

ب- ادرس تغيرات الدالة  $\varphi$  و استنتج إشارة  $\varphi(x)$

$$f(x) = x + 2 - \frac{5}{x - 2} - \frac{6\ln|x - 2|}{x - 2} : \text{ لتكن الدالة } f \text{ المعرفة كما يلي :}$$

$$\text{أ- بين أن : } f'(x) = \frac{\varphi(x)}{(x - 2)^2}$$

ب- استنتج تغيرات الدالة  $f$ .

ليكن  $(\Gamma)$  المنحني البياني للدالة  $f$  في مستو منسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

ج- ادرس الفروع اللانهائية للمنحني  $(\Gamma)$ .

د- احسب  $f(-1)$  ،  $f(0)$  ،  $f(4)$  ،  $f(-4)$  بالتقريب إلى  $\frac{1}{10}$ .

3- تحقق أن النقطة  $\omega(2;4)$  مركز تناظر للمنحني  $(\Gamma)$  ثم ارسم المنحني  $(\Gamma)$ .

**التمرين (21)** الدالة العددية :  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} - 2\ln x$

وليكن  $C_f$  منحنيتها البياني في المستوي المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1/ ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحني  $C_f$ .

2/ أنشئ المنحني  $C_f$ .

3/ استنتج إنشاء  $(\Gamma)$  المنحني الممثل للدالة  $g$  المعرفة كما يلي :  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{|x|} - \ln x^2$

**التمرين (22)** نعتبر الدالة العددية  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  و المعرفة كما يلي :

$$f(x) = x + \ln|e^x - 2|$$

ولیکن  $C_f$  منحنیها البياني في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$   
1/ ادرس تغيرات الدالة  $f$

2/ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من مجموعة تعريف الدالة  $f$  ، يمكن كتابة  $f(x)$

$$\text{على الشكل : } f(x) = 2x + \ln|1 - 2e^{-x}|$$

3/ بيّن أن  $C_f$  يقبل مستقيمين مقاربين  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$  معادلتهما على التوالي :

$$y = 2x \quad , \quad y = x + \ln 2$$

4/ عيّن نقاط تقاطع  $C_f$  مع محور الفواصل.

5/ أنشئ المنحني  $C_f$ .

**التمرين (23)** ادرس تغيرات كل دالة من الدوال التالية و الفروع اللانهائية للمنحني الممثل لها ثم

ارسم تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1} + \ln|x+1| \quad /3 \quad , \quad f(x) = \ln x + (\ln x)^2 \quad /2 \quad , \quad f(x) = \ln(x-2)^2 \quad /1$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} + \ln|x| \quad /6 \quad , \quad f(x) = \frac{x+3+2\ln(x+1)}{x+1} \quad /5 \quad , \quad f(x) = \frac{1}{x}(1+\ln x) \quad /4$$

$$f(x) = \ln(x^2 - 2x + 2) \quad /8 \quad , \quad f(x) = x^2 - 3x + \frac{5}{2} \ln|2x+3| \quad /7$$

$$f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)} \quad /11 \quad , \quad f(x) = -2x + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \quad /10 \quad , \quad f(x) = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| \quad /9$$

$$f(x) = \ln\frac{1}{2}(e^x - 2)^2 \quad /13 \quad , \quad f(x) = x^2 - 2x - \ln(x-1)^2 \quad /12$$

**التمرين (24)** I- نعتبر العدد الطبيعي  $n$  حيث :  $n = 2^{1234}$

(أ) عيّن بإستعمال حاسبة الجزء الصحيح للعدد  $\log n$ .

(ب) استنتج الحصر التالي :  $10^{371} \leq n < 10^{372}$  ثم حدد عدد الأرقام في الكتابة العشرية للعدد  $n$

II- 1. ما قيمة  $pH$  محلول يحتوي على  $5 \times 10^{-8} \text{ moles}$  من شوارد  $H^+$  في اللتر الواحد ؟

2. ما هو التركيز المولي بشوارد  $H^+$  لمحلول متعادل ( $pH = 7$ ) ؟

III- حل في  $\mathbb{R}$  ما يلي :  $\log(x) = 5$  ،  $\log(x) = -3$  ،  $\log(x) \geq 0.1$  ،

$$\log(x) < \log(1-x)$$

**التمرين (25)**  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  متتالية عددية حدودها موجبة معرفة كما يلي :

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ (u_{n+1})^2 \cdot e = u_n \end{cases}$$

نعتبر المتتالية  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  المعرفة كما يلي :  $v_n = \frac{1 + \ln u_n}{2}$

- 1/ أثبت أن  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول
- 2/ اكتب  $v_n$  ثم  $u_n$  بدلالة  $n$  . 3/ ادرس تقارب المتتالية  $(u_n)$
- 4/ احسب المجموع  $S$  بدلالة  $n$  حيث :  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_n$
- 5/ ما هي طبيعة المتتالية  $(t_n)$  حيث :  $t_n = \ln u_n$

**التمرين (26) -1**  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متتالية هندسية حدودها موجبة حيث :

$$\ln u_2 - \ln u_4 = 4 \quad \text{و} \quad \ln u_1 + \ln u_5 = -12$$

- عيّن أساس هذه المتتالية الهندسية وحدها  $u_0$  . احسب  $u_n$  بدلالة  $n$
- نسمي  $S_n$  المجموع :  $u_0 + u_1 + \dots + u_n$  . احسب  $S_n$  بدلالة  $n$  ثم  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
- 2  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المتتالية العددية المعرفة كما يلي :  $v_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$
- بيّن أن  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها.
- نسمي  $T_n$  المجموع :  $v_0 + v_1 + \dots + v_n$  . عيّن العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون :  $T_n^2 = 2^{30}$

**التمرين (27)**  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  متتالية هندسية حدودها موجبة حيث :

$$\begin{cases} u_3 - u_1 = 3 \ln 2 \\ u_1 u_2 u_3 = 8 (\ln 2)^3 \end{cases}$$

- 1/ عيّن  $u_2$  ثم  $u_1$  و  $u_3$  ثم الأساس  $r$  لهذه المتتالية .
- 2/ احسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث :  $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$
- 3/ عيّن  $n$  بحيث :  $S_n = 31 \cdot \ln 2$

**التمرين (28)** المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس .

1. بالنسبة لكل دالة من الدوال التالية اشرح كيف يتم الحصول على منحنيها البياني (C) انطلاقا من التمثيل البياني  $(\Gamma)$  للدالة اللوغاريتمية النيبيرية ثم أرسم (C) .

(أ)  $f(x) = 1 + \ln x$  (ب)  $g(x) = -\ln x$

(جـ)  $h(x) = \ln(x + 2)$  (د)  $k(x) = 1 + \ln(x - 1)$

2. نعتبر الدالتين  $\psi$  و  $\varphi$  المعرفتين على  $\mathbb{R}^*$  كما يلي :  $\varphi(x) = \ln(|x|)$  و  $\psi(x) = |\ln(|x|)|$

نرمز إلى منحنيهما البيانيين على التوالي بـ  $(C_\varphi)$  و  $(C_\psi)$  .

- بين أن المنحني  $(C_\varphi)$  متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب ثم أرسمه .
- أرسم المنحني  $(C_\psi)$  انطلاقا من المنحني  $(C_\varphi)$  .

## التدريب على حل مسائل (دراسة دوال والتوظيف) - الجزء الرابع

**مسألة (01) 1.** نعتبر الدالة  $g$  ذات المتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:

$$g(x) = x^2 + 3 - 2\ln x$$

(أ) ادرس اتجاه تغيرات الدالة  $g$ .

(ب) استنتج إشارة  $g(x)$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

2. لتكن  $f$  الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$$

$C$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  الوحدة  $2cm$ .

(أ) بين أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  لدينا:  $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$

استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ .

(ب) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، فسر هذه النتيجة بيانياً.

(ج) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

ليكن  $D$  المستقيم الذي معادلته  $y = \frac{1}{2}x$ ، احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( f(x) - \frac{1}{2}x \right)$  ثم فسر النتيجة بيانياً.

(د) أنشئ جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(هـ) أنشئ المستقيم  $D$  والمنحنى  $C$  الممثل للدالة  $f$ .

**مسألة (02)** المستوي منسوب إلى معلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  متعامد و متجانس.

1. نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$

ادرس تغيرات الدالة  $g$ . بين أن  $g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  موجب، استنتج إشارة  $g(x)$ .

2. لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = x + \frac{\ln x}{x}$

(أ) بين أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  لدينا:  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ ، عين نهايتي  $f$  عند  $0$  و عند  $+\infty$ .



ج) بين أن المستقيم  $d$  الذي معادلته  $y = x$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$  الممثل للدالة  $f$   
 عين النقطة التي يقطع عندها المستقيم  $d$  المنحنى  $(C_f)$ .  
 د) أنشئ المنحنى  $(C_f)$ .

**مسألة (03)** الدالة العددية  $f$  معرفة على المجال  $I$  حيث  $I = ]-2; +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = 1 + x \ln(x + 2)$$

$(C)$  تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. أ) أحسب  $f'(x)$  و  $f''(x)$  من أجل كل عدد من  $I$ .

ب) عين إشارة  $f''(x)$  ثم استنتج وجود عدد حقيقي وحيد  $\alpha$  من المجال

$$[-0,6; -0,5]$$

بحيث  $f'(\alpha) = 0$ .

2. أدرس تغيرات الدالة  $f$ .

3. بين أن  $f(\alpha) = \frac{\alpha + 2 - \alpha^2}{\alpha + 2}$  ثم استنتج حصر  $f(\alpha)$ .

4.  $M_0$  نقطة من  $(C)$  فاصلتها  $x_0$  و  $(T_{x_0})$  المماس للمنحنى  $(C)$  في  $M_0$ .

أ) بين أن  $(T_{x_0})$  يمر بالمبدأ  $O$  إذا وفقط إذا كان  $f(x_0) = x_0 f'(x_0)$ .

ب) استنتج وجود مماسين  $(T_a)$  و  $(T_b)$  يمران بالمبدأ  $O$ . عين العددين  $a$  و  $b$ .

5. أرسم المماسين  $(T_a)$  و  $(T_b)$  ثم المنحنى  $(C)$ .

**مسألة (04)**: نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = 3 \ln x - (\ln x)^2$$

وليكن  $(C)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1- بين أن المستقيم ذا المعادلة  $x = 0$  مقارب لـ  $(C)$ .

2- احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

3- احسب  $f'(x)$ ، حيث  $f'$  الدالة المشتقة للدالة  $f$ .

4- حل في المجال  $]0; +\infty[$  المعادلة:  $3 - 2 \ln x = 0$  ثم المتراجحة  $3 - 2 \ln x > 0$

مستنتجا إشارة  $f'(x)$ .

5- اكتب جدول تغيرات الدالة  $f$ .

6- حل في  $]0; +\infty[$  المعادلة  $f(x) = 0$  وفسر النتيجة هندسيا.

أنشئ المنحنى  $(C)$ .

**مسألة (05)** نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة كما يلي :  $f(x) = \frac{x-1}{x+2} + \ln\left(\frac{x}{x+2}\right)$  :

وليكن  $(C)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1- ادرس تغيرات الدالة  $f$

2- بين أن  $(C)$  يقبل عند نقطتين منه  $A$  و  $B$  مماسين معامل توجيه كل منهما يساوي 1 ، عيّن عندئذ إحداثيات نقطتي التماس  $A$  و  $B$ .

3- بين ان المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $x_0$  حيث  $x_0 \in \left] \frac{7}{2}; \frac{13}{4} \right[$

4- احسب  $f(2)$  ،  $f(-5)$  ،  $f(-3)$  ثم أنشئ  $(C)$

5- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول

الحقيقي  $x$  التالية :  $(x+2)\ln\left(\frac{x}{x+2}\right) - mx - 2m - 3 = 0$

**مسألة (06)** الجزء الأول: نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة كما يلي :  $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln(x)$

1- ادرس تغيرات الدالة  $g$ . -2 استنتج أنه لكل  $x \in \mathbb{R}_+^*$  فإن  $g(x) \geq \frac{1}{2}$ .

الجزء الثاني :  $f$  الدالة العددية :  $x \rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{\ln x}{x}$

$(\delta)$  المنحني الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أثبت أنه لكل  $x \in \mathbb{R}_+^*$  فإن  $f'(x) = \frac{1+g(x)}{x^2}$

(2) ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحني  $(\delta)$

(3) ادرس وضعية المنحني  $(\delta)$  بالنسبة للمستقيم المقارب المائل

(4) أثبت أن المنحني  $(\delta)$  يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

(5)  $(\Delta)$  هو مماس للمنحني  $(\delta)$  في النقطة ذات الفاصلة  $x_0$  ، عيّن  $x_0$  إذا كان ميل  $(\Delta)$  هو  $\frac{1}{2}$

ثم اكتب معادلة  $(\Delta)$

(6) أثبت أن المنحني  $(\delta)$  يقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها  $x_1$  حيث :  $\frac{1}{2} < x_1 < 1$

(7) أنشئ  $(\Delta)$  و  $(\delta)$  (تؤخذ  $2cm$  وحدة للطول)

(8) ناقش بيانيا وحسي قيم الوسيط  $m$  وجود وعدد حلول المعادلة :  $f(x) = \frac{1}{2}x + m$

مسألة (07) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة كما يلي:  $f(x) = \frac{3}{x} - x + 4 \ln x$

( $\delta$ ) المنحني الممثل للدالة  $f$  في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- 1) ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحني ( $\delta$ ).
- 2) احسب:  $f(5)$  و  $f(9)$  و  $f(10)$  وتحقق أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا محصورا بين 9 و 10
- 3) أثبت أن المنحني ( $\delta$ ) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها ثم اكتب معادلة المماس في هذه النقطة
- 4) برهن على أنه يوجد مماسان للمنحني ( $\delta$ ) معامل توجيه كل منهما  $\frac{1}{4}$
- 5) ارسم المنحني ( $\delta$ )

6) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة كما يلي:  $g(x) = \frac{3-x^2}{|x|} + 2 \ln x^2$

- أ) أثبت أن الدالة  $g$  زوجية
- ب) ارسم المنحني ( $C_g$ ) الممثل للدالة  $g$  انطلاقا من رسم المنحني ( $\delta$ ).

مسألة (08) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة كما يلي:  $f(x) = (x+2) - 2 \ln |2x+1|$

( $C_f$ ) المنحني الممثل للدالة  $f$  في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- I -1 ادرس تغيرات الدالة  $f$  و الفروع اللانهائية للمنحني ( $C_f$ )
- 2 بين أن المنحني ( $C_f$ ) يقبل مماسا ( $\Delta$ ) معامل توجيهه (-3). اكتب معادلة لـ ( $\Delta$ )
- 3 احسب إحداثيات نقطتي تقاطع ( $C_f$ ) مع المستقيم ذي المعادلة  $y = x$
- 4 احسب  $f(-1)$  و  $f(0)$ . ارسم المماس ( $\Delta$ ) و المنحني ( $C_f$ ).
- 5 ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط  $m$  وجود وإشارة حلول المعادلة:  $f(x) = x + m$

(II) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة كما يلي:  $g(x) = \frac{3}{2} + \left| x + \frac{1}{2} \right| - \ln(2x+1)^2$

1- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  يختلف عن  $\left(\frac{-1}{2}\right)$  يكون لدينا :

$$g(-1-x) = g(x) \quad \text{و} \quad -1-x \neq \frac{1}{2}$$

- 2 استنتج أن ( $\Gamma$ ) المنحني الممثل للدالة  $g$  يقبل محور تناظر يطلب تعيين معادلته
- 3 أثبت أن  $g(x) = f(x)$  على مجال يطلب تعيينه.
- 4 استنتج إنشاء ( $\Gamma$ ) انطلاقا من ( $C_f$ ). ارسم ( $\Gamma$ ) في نفس المعلم السابق

**مسألة (09) I** و  $f$  و  $g$  دالتان معرفتان على  $[0; +\infty[$  كما يلي:

$$g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \text{ و } f(x) = \ln(1+x) - x$$

1. ادرس تغيرات كل من  $f$  و  $g$  على  $[0; +\infty[$ .

2. استنتج أنه من أجل كل  $x \geq 0$  :  $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$

II. نريد دراسة المتتالية  $(u_n)$  للأعداد الحقيقية المعرفة كما يلي:  $u_1 = \frac{3}{2}$  و  $u_{n+1} = u_n \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right)$

1. برهن بالتراجع أن  $u_n > 0$  من أجل كل عدد طبيعي  $n \geq 1$

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n \geq 1$  :

$$\ln u_n = \ln \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)$$

3. نضع  $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n}$  و  $T_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \dots + \frac{1}{4^n}$

باستعمال الجزء I ، بين أن:  $S_n - \frac{1}{2}T_n \leq \ln u_n \leq S_n$

4. احسب  $S_n$  و  $T_n$  بدلالة  $n$ . استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  و  $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$

5. أ- بين أن المتتالية  $(u_n)$  متزايدة تماما.

ب- استنتج أن  $(u_n)$  متقاربة ، لتكن  $l$  نهايتها.

ج- نقبل النتيجة التالية: " إذا كانت متتاليتان  $(v_n)$  و  $(w_n)$  متقاربتان حيث  $v_n \leq w_n$  من أجل

كل عدد طبيعي  $n$  فإن:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$  "

د- بين إذن أن:  $\frac{5}{6} \leq \ln l \leq 1$ . استنتج حصر  $l$ .

**مسألة (10)** نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة كما يلي:  $f(x) = -x + \frac{\ln x}{x}$

$(C_f)$  المنحني الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) برهن أن  $(C_f)$  يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيينهما

(2) ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم المقارب المائل

(3) نعتبر الدالة  $\varphi$  المعرفة كما يلي:  $\varphi(x) = -x^2 + 1 - \ln x$

(أ) ادرس تغيرات الدالة  $\varphi$ . (ب) احسب  $\varphi(1)$  ثم استنتج إشارة  $\varphi(x)$

(4) ادرس تغيرات الدالة  $f$

(5) ارسم المنحني  $(C_f)$

**مسألة (11) I-** نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty[$  كما يلي :  $g(x) = xe^{-x}$

1- ادرس تغيرات الدالة  $g$  . -2 استنتج أنه لكل  $x \in [0; +\infty[$  فإن  $g(x) < 1$

**II-**  $f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $[0; +\infty[$  :  $f(x) = e^{-x} + \ln x$

1- احسب :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  ثم فسر النتيجة هندسيا

2- احسب :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم ادرس طبيعة هذا الفرع اللانهائي

3- بيّن أن :  $f'(x) = \frac{1-g(x)}{x}$

4- شكل جدول تغيرات الدالة  $f$

5- بيّن أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $x_0$  في المجال  $]0.5; 0.6[$

6- ارسم المنحني  $C$  الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ومتجانس .

**مسألة (12)**  $m$  عدد حقيقي ، نعتبر الدالة  $f_m$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي :

$f_m(x) = \frac{x^2 - 1}{2} - m \ln x$  ،  $C_m$  تمثيلها البياني

1-أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$  . ب) حسب قيم الوسيط  $m$  ، احسب نهاية  $f_m$  عند 0

2- عيّن الدالة المشتقة للدالة  $f_m$  .

أعط حسب قيم  $m$  ، مختلف جداول التغيرات الممكنة

3- لتكن  $M_0(x_0, y_0)$  نقطة من المستوي بحيث :  $x_0 > 0$  و  $x_0 \neq 1$

أ) برهن أنه يمر منحني وحيد  $C_m$  بالنقطة  $M_0$

ب) بيّن أنه توجد نقطة وحيدة  $A$  تنتمي إلى كل المنحنيات  $C_m$  .

4- ارسم  $C_0$  ،  $C_4$  ،  $C_{-1}$  في نفس المعلم

**مسألة (13)** نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :  $f(x) = \ln(e^{2x} - e^x + 1)$

( $C$ ) المنحني الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد و متجانس

1. أ- ادرس نهايات الدالة  $f$  عند  $-\infty$  وعند  $+\infty$  .

ب- عين الدالة المشتقة للدالة  $f$  .

ج- ادرس إشارة  $f'(x)$  . استنتج تغيرات  $f$  .

2. أ- بين أن المستقيم  $D$  الذي معادلته  $y = 2x$  مقارب للمنحني ( $C$ ) عند  $+\infty$  .

ب- ارسم المستقيم  $D$  والمنحني ( $C$ ) .

3. عدد حقيقي موجب تماما

ناقش حسب قيم  $k$  عدد حلول المعادلة  $e^{2x} - e^x + 1 - k = 0$

أ) بالحساب . ب) باستعمال تغيرات الدالة  $f$  .

مسألة (14) دالة عددية معرفة على  $]-\infty; 3[$  كما يلي:  $f(x) = -40 \ln\left(1 - \frac{x}{3}\right) - 10x$

و (C) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(o; \vec{i}; \vec{j})$  (الوحدة: 1cm).

الجزء الأول:

1. بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً ظاهراً.
2. ادرس اتجاه تغيرات الدالة  $f$  على المجال  $]-\infty; 3[$ .
3. احسب  $f(-1)$  و  $f(3-3e)$ . تعطى في كل حالة النتيجة المضبوطة ثم بتقريب  $\frac{1}{10}$ .
4. أ) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً، وحلاً وحيداً  $\alpha$  في المجال  $]-1; 3-3e[$  (لا يطلب حساب  $\alpha$ ).


ب) بين أن  $\ln\left(1 - \frac{\alpha}{3}\right) = -\frac{\alpha}{4}$  (ج) اعط قيمة للعدد  $\alpha$  بتقريب  $\frac{1}{10}$ .

الجزء الثاني: 1. أوجد  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

2. نعرف على  $]-\infty; 3[$  الدالة  $g$  كما يلي:  $g(x) = \frac{f(x)}{3-x}$

أ) بين أن  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 10$  (ب) استنتج  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

3. ارسم المماس  $T$  في النقطة التي فاصلتها 0 ثم المنحنى (C) (نأخذ  $\alpha \approx -2,2$ ).



اخترت لك:

الهدية

إذا كنت في قومٍ فصاحب خيارهم \*\*\* ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي  
عن المرء لا تسلّ وسلّ عن قرينه \*\*\* فكلُّ قرينٍ بالمقارن يقتدي

**أثبتت الأبحاث الحديثة أن درجة الحفظ تكون عالية في الأيام الأولى للتعلم وسرعان**

ما تضعف إذا لم يتم تأكيدها بالمراجعة والتكرار.

– ثبت أن الحفظ على ظهر قلباي بدون فهم حقيقي يكون أكثر عرضة للنسيان في الحفظ للمادة المفهومة فلاشك أنه من السهل أن يحفظ الطالب جملة مفيدة مفهومة في لغته الأصلية بعكس الحال عندما يحاول تعلم جملة أخرى لا تزيد عنها في الكلمات والحروف ولكنها من لغة أجنبية مجهولة

– أيضاً ثبت أن لفهم القصيدة الشعرية دوراً كبيراً في تسهيل حفظها

– ومن المهم التمرين على التطبيق لما تم حفظه لتثبيتته فعلاً مثلاً يستطيع الطالب أن يحفظ معاني ألف كلمة إنجليزية لكن إذا لم يتمرن على استخدامها فعلياً فتقل درجة حفظه لهذه الكلمات تدريجاً